



# Etude probabiliste de structures combinatoires

Jean-François Marckert

► **To cite this version:**

Jean-François Marckert. Etude probabiliste de structures combinatoires. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. <inria-00495671>

**HAL Id: inria-00495671**

**<https://hal.inria.fr/inria-00495671>**

Submitted on 28 Jun 2010

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Étude probabiliste de structures combinatoires

Session organisée par **Jean-François Marckert**

La combinatoire consiste en l'étude des structures discrètes, comme par exemple, les chemins, les graphes, les arbres, les quadrangulations, les tableaux de Young, les pavages d'une région du plan par des polygones, automates, certaines matrices aléatoires... Étudier une famille d'objets combinatoires consiste premièrement à comprendre la structure des objets, les décomposer si possible, compter combien d'objets de taille  $n$  existent, chercher des bijections entre notre famille et d'autres familles bien étudiées, etc.

Lorsque cela est possible on s'intéresse également à des paramètres des ces objets (par exemple, la hauteur des arbres à  $n$  noeuds). En terme probabiliste, on munit la famille des objets de taille  $n$  de la loi uniforme, ou d'une autre loi, et on regarde la moyenne, ou la distribution, exacte ou limite, du paramètre en question ; ce paramètre n'est rien de plus (ni de moins) qu'une variable aléatoire.

L'étude des structures combinatoires par le truchement des probabilités apporte beaucoup à la compréhension des objets combinatoires :

- elle donne une explication souvent simple à des phénomènes observés uniquement par des simulations, ou par des calculs fort compliqués,
- elle permet la description globale de certains objets limites (par exemple, les chemins composés de  $+1$  et  $-1$  de taille  $n$  normalisés convergent vers le Brownien, les arbres binaires à  $n$  noeuds, normalisés, convergent vers un arbre continu "Brownien" ; il s'agit d'une convergence de l'objet global). Ceci est l'apanage des méthodes probabilistes,
- elle permet une approche discrète des objets continus,
- elle permet d'ajouter parfois une composante temporelle dans l'étude des objets combinatoires (par exemple, on construit un arbre en ajoutant successivement des noeuds... au lieu de regarder la loi de l'arbre  $t_n$  de taille  $n$  obtenu seulement, on peut dire des choses sur la suite  $(t_k)$ , donnant une description des phénomènes en jeu beaucoup plus claire).

Dans les exposés de la session, les orateurs vont illustrer ces liens riches qui existent entre combinatoire et probabilité.

*Références :*

- [1] *Random Planar Lattices and Integrated SuperBrownian Excursion*, Chassaing & Schaeffer (2004) Probability Theory and Related Fields, 128, n°2, pp. 161-212.

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

Journées MAS 2010, Bordeaux

- [2] *A functional combinatorial central limit theorem. (Janson- Barbour.)* (2009)  
Electronic J. Probab. 14 , paper 81, 2352-2370.

*Adresse de l'organisateur :*

Jean-François MARCKERT  
CNRS, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique  
351, cours de la Libération  
F-33405 Talence France  
E-mail : [marckert@labri.fr](mailto:marckert@labri.fr)  
<<http://www.labri.fr/perso/marckert>>

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

## **Combinatoire sur des structures aléatoires**

par **Charles Bordenave**

Sur un graphe fini, il existe de nombreux objets combinatoires dignes d'intérêt : ses arbres couvrants, ses appariements, ses ensembles stables, ses cycles et ainsi de suite. Dénombrer ces objets n'est pas évident d'un point de vue algorithmique. En revanche, la situation se simplifie si au lieu d'un graphe donné on considère un graphe aléatoire. Lorsque la taille du graphe aléatoire tend vers l'infini, il est parfois possible de calculer les limites d'échelle de ces objets combinatoires et obtenir des formules asymptotiques.

Dans cet exposé, nous présenterons des problèmes ouverts et des résultats récents dans cette direction. Nous discuterons notamment un travail récent avec Marc Lelarge et Justin Salez sur les appariements.

*Adresse :*

Charles BORDENAVE

CNRS & Université de Toulouse

UMR 5219 Institut de Mathématiques de Toulouse

118 route de Narbonne

31062 Toulouse - France

E-mail : [charles.bordenave@math.univ-toulouse.fr](mailto:charles.bordenave@math.univ-toulouse.fr)

<<http://www.math.univ-toulouse.fr/~bordenave/>>

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

## **Produit de valeurs d'une courbe de Harnack sur un tore et asymptotiques de fonctions de partition de dimères**

par **Cédric Boutillier**

Un modèle de dimères sur un graphe plan biparti périodique est un modèle de mécanique statistique exactement soluble, pour lesquels de nombreuses quantités peuvent s'exprimer à l'aide du polynôme caractéristique associé  $P(z, w)$ . Kenyon et Okounkov ont démontré que les polynômes caractéristiques de tels modèles de dimères sont exactement les polynômes définissant les courbes de Harnack, des courbes algébriques aux propriétés de maximalité très intéressantes. Je donnerai une formule asymptotique pour le produit de valeurs d'un tel polynôme  $P$  pour  $z$  et  $w$  des racines  $n$ -ièmes. J'en déduirai des informations probabilistes pour les modèles de dimères sur des grands tores (comme la distribution du nombre d'enroulement) mais aussi pour d'autres modèles : le modèle d'Ising et les forêts couvrantes enracinées sur des cycles.

*Adresse :*

Cédric BOUTILLIER

LPMA

LPMA, Université Pierre et Marie Curie

Case courrier 188 – 4 Place Jussieu

75252 Paris Cedex 05 FRANCE

E-mail : [cedric.boutillier@upmc.fr](mailto:cedric.boutillier@upmc.fr)

<<http://www.proba.jussieu.fr/~boutil>>

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

## **Règle de minorité : aspects probabilistes**

par **Lucas Gerin**

Pour un graphe  $G$ , la règle de minorité sur  $G$  est le processus à valeurs dans  $0,1^G$  défini de la façon suivante : à chaque instant on tire certains sites au hasard, et on met chacune dans l'état qui est minoritaire dans son voisinage.

On s'est rendu compte récemment dans la communauté algorithmes/combinatoire que des questions très simples (existence de points fixes, temps d'atteinte) sur des graphes très simples (grille finie ou infinie, arbres, cercle, ...) pouvaient poser des problèmes très jolis, liés à des thèmes connus en probabilités : transitions de phase, percolation, interactions entre marches aléatoires, etc. J'essaierai d'expliquer ces liens.

*Adresse :*

Lucas GERIN

Modélisation aléatoire de Paris Ouest Nanterre La Défense

Université Paris Ouest, Modal'X - Bâtiment G

200 avenue de la République 92000 NANTERRE

E-mail : [Lucas.Gerin@iecn.u-nancy.fr](mailto:Lucas.Gerin@iecn.u-nancy.fr)

<http://www.iecn.u-nancy.fr/~gerin>

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires

## **Cartes infinies uniformes du plan**

par **Laurent Ménard**

Nous allons présenter différents types de cartes planaires aléatoires infinies, qui sont des limites locales de cartes planaires aléatoires finies. Nous verrons que certaines propriétés de ces objets peuvent être étudiées par des méthodes bijectives, à l'instar de la carte brownienne. Nous verrons aussi comment un procédé d'échantillonnage par faces permet d'étudier la percolation sur ces cartes infinies aléatoires.

*Adresse :*

Laurent MÉNARD

Laboratoire de Probabilités

Université Pierre et Marie Curie 4<sup>ème</sup> étage, plateau E, bureau 8 16 rue Clisson  
75013 PARIS

E-mail : [laurent.menard@normalesup.org](mailto:laurent.menard@normalesup.org)

<>

Session : Étude probabiliste de structures combinatoires